

成  
方  
切  
用

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷四上

攻下門

正方二十四  
附方一十八

大承氣湯

三一

承氣湯  
黃龍湯

六一  
順氣  
麻仁丸

小承氣湯

三

湯厚朴  
大黃湯

調胃承氣湯

當歸承氣湯  
甘草湯

破棺丹  
大黃

大陷

胸湯

散白

小陷胸湯

大陷胸丸

十棗湯

三化神  
佑丸

小胃丹

赤金豆

三物備急丸

備急散

太平丸

礞砂

丸

敦阜丸

木香檳榔丸

木香導氣丸

百順丸

枳

實導滯丸

倒倉法

霞天膏

蜜煎導法

豬膽導法

鹽合草烏導法

醬薑導法

大螺著小腹法

罨傷寒結胸法

又附子瀉心湯

見瀉火門

大黃黃連瀉心湯

見瀉火門

抵當

湯

見理血門

桃仁承氣湯

見理血門

感應丸

見祛寒門

久痛丸

見祛寒門

寒天台烏藥散

見祛寒門

竹葉熏法

蘿蔔菜熏法

吳氏醫學述第四種

門人周蘭九生庭

武原吳儀洛遵程輯

男

有榆蒼培同較  
有杜雋望

成方切用

攻下門

凡攻氣者攻其聚聚可散也攻血者攻其瘀瘀可通也攻積者攻其堅在

臍者可破可行在經者可針可灸也攻痰者攻其急真實者暫宜解標多虛者只宜求本也但諸病之實有微甚用攻之法分輕重大實者攻之未及可以再加微實者攻之太過每以致害所當慎也凡病在陽者不可攻陰病在胸者不可攻臍若此者病必乘虛內陷

所謂引賊入門也。病在陰者，勿攻其陽。病在裏者，勿攻其表。若此者，病必因誤而甚。所謂自撤藩蔽也。大都治宜用攻，必其病邪之甚者也。若實邪既甚，自與攻藥相宜，不必難之。補劑蓋實不嫌攻。若但略加甘滯，便相牽制。虛不嫌補。若但略加消耗，便覺相妨。所以純虛者，最不喜清熱實者，最不喜煖然實而誤補，不過增病。病增者可解虛而誤攻，必先脫元。元脫者，無治矣。是皆攻法之要也。其或虛中有實，實中有虛，此又當酌其權宜，不在急宜攻急宜補之例。雖然，凡用攻之法，所以除兇剪暴也。亦猶後世之兵，必不可無。然必下得已，乃可用之。若或有疑，再加詳慎。蓋攻雖去邪，無弗傷氣傷血。實自古仁人所深忌者。正恐其成之難，敗之易爾。

大承氣湯

景仲

治傷寒陽明腑證陽邪入裏胃實

不大便發熱譫語自汗出不惡寒痞滿燥實堅

全見雜病三焦大熱脈沉實者

陽明外證身熱汗出不惡寒反

惡熱是也此為在經仍當汗散若熱邪已入胃

無次也虛則鄭聲一語頻言也陽明多血多氣

法當自汗過汗亡液無水以制火腸胃有燥糞

結而不下故妄見妄言也經曰何緣得陽明病

曰太陽病若汗若下若利小便此亡津液胃中

乾燥因轉屬陽明胃實大便難也又曰太陽初

病發其汗汗先出不微因轉屬陽明陽明證能

食為中風風陽邪能消穀不能食為中寒寒陰

邪不能消穀以此為辨。胸悶不食為痞。胸腹

膨脹為滿。大便枯少為燥。腹滿

痛不大便為實。按之石硬為堅。亦治陽明剛瘕

此太陽兼陽明證其證腹滿口噤。臥不着席。拳

足齟齒而無汗。謂之剛瘕。宜下之者以陽明主

潤宗筋風寒溼熱傷陽明胃津液不行筋失所養故以此湯下溼熱行津液喻嘉言曰傷寒腹滿可下胸滿不可下謂熱邪尚在表也此證入裏之熱極深極重陽熱既極陰血立至消亡小下之尚不能勝必大下之以承領其一線之陰陰氣不盡為陽所劫因而得生者多矣既有下多凶陰之大戒復有急下救陰之活法學者陰造端在斯矣。經曰陽明居中土也萬物所歸無所復傳以胃為水穀之海四旁有病皆傳入胃已入胃腑則不復傳他經矣。

**大黃**

四兩酒洗王海藏曰邪氣居高非酒不到若用生者則遺高分之邪熱病愈後變生

目赤喉痺頭腫

**芒硝**

三合

**厚朴**

半斤

**枳實**

五枚

**先煎**

**朴實將熟內大黃煮二三沸傾碗內和芒硝服**

**得利則止**

陶節菴曰去實熱用大黃無枳實不通經用附子無乾薑不熱發表用

麻黃無蔥白不發吐痰用瓜蒂無淡豉不湧竹  
瀝無薑汁不能行經務蜜導無皂莢不能通秘  
結

熱淫於內治以鹹寒氣堅者以鹹軟之熱盛者  
以寒消之故用芒硝之鹹寒以潤燥軟堅大黃  
之苦寒以瀉熱去瘀下燥結泄胃強枳實厚朴  
之苦降瀉痞滿實滿經所謂土鬱奪之也陽明屬土  
大黃治大實芒硝治大燥大堅二味治有形血  
藥也厚朴治大滿枳實治痞二味治無形氣藥  
也然非大實大滿不可輕投恐有寒中結胸痞

氣之變

此大小陷胸湯之所由作也。承順也。十劑曰通可去滯世可去閉使塞者利



而開者通正氣得舒故曰承氣。仲景曰：欲行大承氣，先與小承氣。若腹中轉失氣者，有燥屎也。可以大承氣攻之。若不轉失氣者，此但初鞭後溲，不可攻之。攻之必脹滿，不能食也。又曰：陽明病，脈遲，汗出多，微惡寒者，表未解也。可發汗，宜桂枝湯。陽明病，脈浮，無汗而喘者，發汗則愈，宜麻黃湯。此斷其入陽明之路。仍從外解，則不內攻也。又曰：陽明病，應發汗，醫反下之，此為大逆。皆仲景慎於攻下之意也。喻嘉言曰：陽明以胃實為正，則皆下證也。陽明之邪，其來路則由太陽。凡陽明證，見八九而太陽證有一二未罷，仍從太陽而不從陽明，可汗而不可下也。其去路則趨少陽。凡陽明證，雖見八九而少陽證略見一二，則從少陽而不從陽明。汗下兩不可用也。惟風寒之邪，已離太陽，未接少陽，恰在陽明界內。乘為攻下，則不再傳他經，津液元氣兩無虧損矣。庸愚無識，必待七日，傳經已盡，方敢議下。不知太陽有十餘日不解者，若不辨經而但計

日其誤下。仍在太陽。至陽明二三日。即顯下證。反以計日。當面錯過。及陽明已入少陽。又以計日。妄行攻下。輕者重而重者死矣。仲景法。日數雖多。但有表證而脈沉者。即宜下之。古人有治惡寒戰慄。用大承氣下燥屎而愈者。此陽邪入裏。熱結於裏。表虛無陽。故惡寒戰慄。此陽盛格陰。乃熱病非寒證。誤投熱藥。則死矣。

加甘草等分。名三一承氣湯。治大承氣證。腹

滿實痛。調胃證。譫語下利。小承氣證。內熱不便。

一切傷寒雜病。畜熱內甚。燥實堅脹。謂合三承氣為一方。

也。成無已曰。若大承氣證。反用小承氣。則邪不服。若小承氣證。反用大承氣。則過傷元氣。而腹滿不能食。仲景所以分而治之。後人以三方合而為一。云通治三方之證。及傷寒雜病。內外一

切所傷與仲景之方甚相違戾失軒岐緩急之旨使病人暗受其害將誰咎哉加柴胡

黃芩甘草入鐵繡水三匙墜熱開結名六一順

氣湯節菴謂合三承氣三一承氣大柴胡大陷胸六方而為一方也治潮熱自

汗發渴譫語狂妄斑黃腹滿便實正陽明腑病

加人參甘草當歸桔梗薑棗名黃龍湯治邪熱

傳裏胃有燥屎心下硬痛身熱口渴下利純清

水有燥屎何以又下清水陶節菴曰此非內寒而利乃日飲湯藥而下滲也名熱結利唐醫

妄謂漏底傷寒以熱藥止之殺人多矣年老氣血虛者去芒硝去芒硝加麻仁

杏仁芍藥蜜丸名麻仁丸景仲治跌陽脈浮而濇

浮則胃氣強潛則小便數浮潛相搏大便則難

其脾為約跌陽胃脈也經曰飲食入胃游溢精

調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾主

為胃行其津液者也今胃火乘脾約束津液但

輸膀胱致小便數而大便難故名脾約束與此九

潤燥通腸此太陽傳入陽明之證故仲景曰太

陽陽明脾約是也按成氏釋此證謂脾弱胃強

然本文但云脾約未嘗云脾弱也俞嘉言曰脾

弱即當補矣何為反用大黃朴實乎此脾土過

燥使腸胃津液枯槁致中消便難使脾果弱非

溘即溘焉能反約少胃中之穀食乎陽明證中

凡宜攻下者惟恐邪未入胃大便勿轉今又恐初

鞭後溘未可妄攻故先與小承氣試其轉失氣

方可攻之皆是慮夫脾氣之弱也若脾約證在

太陽即當下矣何待陽明耶朱丹溪曰此由久

病大汗大下之後陰血枯槁內火燔灼熱傷元

氣又傷於脾而成。肺金受火。氣無所攝。腎為肺子。肺耗則液虧。金耗則木寡於畏。土欲不傷。其可得乎。肺失傳送。脾失轉輸。故大便秘而小便數也。理宜滋養陰血。使火不熾而金化。行木有制。而脾土運津液。乃能入胃腸。潤而通矣。此方施之。熱盛而氣實者。則安。若熱盛而血虛者。勿膠柱而鼓瑟也。

當下諸證

發汗不解。腹滿痛者。急下之。下利三

滑而數者。有宿食也。宜下之。心下鞭者。急下之。脈仲景曰。滑則穀氣實。又曰。寸脈浮大。按之反濇。尺中亦微而濇。知有宿食。宜下之。傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。身微熱者。此為實也。急下之。內經曰。諸脈皆屬於目。針經曰。熱病日不明。熱不已者。此腎水將絕。不能照物也。陽明病發熱。汗多者。急下之。汗多則津液而內燥。宜急下以存津液。少陰病得之二

三日口燥咽乾者急下之。邪人未深，便作口燥。此腎水將乾，宜急下以救欲絕之水。少陰證六七日，腹脹不大便者，急下之。此少陰邪熱入胃，腑也。土勝則水乾，宜急下以救腎水。少陰病自利，清水，色純青，心中必痛，口中燥者，急下之。青爲肝色，肝邪乘腎，故下利。陽邪上攻，故口燥。此亦少陰傳入陽明腑證也。厥陰證，舌捲囊縮，宜急下之。此證仲景無治法。按舌捲囊縮，有寒極而縮者，宜附子四逆加吳茱萸黃湯并灸關元氣海、慈熨等法。又有陽明之熱，陷入厥陰經，陽明主潤宗筋，宗筋爲熱所攻，勿藥而急，引舌與羣丸，故舌卷囊縮。此爲熱極，當瀉陽以救陰。以上皆大承氣證也。張兼善曰：胃爲水穀之海，四旁有病，皆能傳入胃土。燥則腎水乾，故陽明與少陰皆有意下之條。證雖不同，其入腑之理則一。故皆用大承氣。有病循衣摸牀，兩手撮空者，此胃熱也。錢仲陽小兒直訣云：此肝熱也。亦承氣湯主之。樓全善曰：嘗治循衣摸牀撮空數人，皆

用大補氣血之劑。惟一人兼振。脈代。遂於補劑中。加桂二分。亦振止脈和而愈。按譚語亦有因氣虛陽脫而然者。當用參附大補之。

忌下諸證

太陽病外證未解。不可下。惡寒為邪在表。不可下。脈浮大為

嘔為邪在上焦。雖有陽明證。不可下。陽明病。不能食。攻其熱。發汗。反下之。此為大逆。陽明病。不可下。陽明病。不能食。攻其熱。必噦。胃中虛冷。故也。太陽陽明合病。喘而胸滿。宜麻黃湯。肺氣清。則胃邪自散。不可下。少陰病。陽虛。尺脈弱。瀉者。不可下。脈數。不可下。數為血虛。下之。則熱邪入裏。血愈虛。而亡陰。惡水者。不可下。下之。裏冷。不嗜食。完穀出。頭痛。目黃者。不可下。諸四逆厥者。不可下。陽微。不可下。下之。痞動氣者。不可下。諸

小承氣湯

仲景一名三

治傷寒陽明證。譚語便

更潮熱而喘及雜病上焦痞滿不通

大黃

四兩

厚朴

二兩

枳實

三枚

水四升

煮一升

二合

去渣

分溫

二服

初服

當更衣

不爾者

盡飲

之若更衣勿服

邪在上焦

則滿

在中焦

則脹

胃實

則潮熱

猶潮水之

來其來有時陽明燥金旺於申酉故

日晡潮熱傷寒潮熱為胃實無虛證

陽邪乘心

則狂

故譫語

胃熱

干肺

則喘

故以枳朴

去上焦之

痞滿

以大黃

蕩胃中

之實熱

此痞滿

燥實堅未

全者

故除

芒硝

欲其無傷

下焦真陰也

陽明證有正陽



陽明有太陽陽明。有少陽陽明。自陽明經傳入胃腑。不惡寒。腹滿便鞭者。宜大承氣下之。若汗多發熱微惡寒者。為外未解。其熱不潮。未可與承氣。若腹大滿不通者。可與小承氣。微和胃氣。勿令大泄下。謂陽明有在經者。未全入腑。尤宜審慎。陽明少自病。多由太陽傳入。成無已曰。自太陽少陽傳入者。眾所共知。自三陰傳入者。鮮或能識。三陰有急下之證多矣。豈非仲景之微旨與。經曰。傷寒脈浮緩。手足溫者。繫在太陰。當發黃。若小便利者。不能發黃。至七八日。大便秘者。陽明病也。程郊倩曰。此證謂之太陰陽明。陽明為病。本之胃實。不特三陽受邪。能轉屬陽明。三陰亦能轉屬陽明。推之少陰。三大承氣。厥陰一小承氣。何非轉屬陽明之病哉。

金匱用治支飲胸滿更名厚朴大黃湯

徐忠可曰。言支

飲。則必稍偏矣。然不引痛脇下。亦不言脇支滿。而只胸滿。雖是偏而不甚偏。故可直驅之。而用

小承氣氣順則自下也。此即小承氣治腹滿之病而閉者。即曰三物湯。蓋此重散結氣。故以厚朴為主。彼乃與比加羌活名三化湯。機治中物湯對照言之也。

風邪氣作實二便不通

三化者使三焦通利復其傳化之常也加羌活

者病本於風也然中風多虛氣上逆無用承氣之理非堅實之體不可輕投

調胃承氣湯

仲景

治傷寒陽明病不惡寒反惡熱

口渴便閉譫語腹滿中焦燥實及傷寒吐後腹

脹滿者

邪在表則身熱汗出而惡寒邪已入裏則表證罷故不惡寒身熱汗出而反惡

熱也汗多亡津熱又入裏故口渴便閉無水以制火內有燥屎故妄見妄言而譫語吐後不解

腹脹滿者熱入胃也然滿而不痛不宜急下故少與調胃和之陽明病不吐不

文  
方  
月  
司  
攻

調胃承氣湯

二  
調胃承氣湯

八

下而心煩者

吐後煩為內煩。下後煩為虛煩。亦不吐不下心煩者。胃有鬱熱也。

治渴證中消善食而洩

大黃

酒浸

芒硝

兩

甘草

炙五錢

少少溫服

大黃苦寒除熱蕩實芒硝鹹寒潤燥軟堅二物

下行甚速故用甘草甘平以緩之不致傷胃故

曰調胃承氣去枳朴者不欲其犯上焦氣分也

準繩曰陽明一證分為太陽陽正陽少陽三等按本草大黃酒浸入太陽經酒洗入陽明經浸久

於洗故能引於至高之分仲景以調胃承氣收

入太陽門而大黃註曰酒浸湯後曰少少溫服曰當和胃氣又本湯治不吐不下心煩者及發汗不解蒸蒸發熱者吐後腹脹滿者是大陽陽

明去表未遠其病在上不當攻下故宜緩劑調和之也。至正陽陽明則日急下之而大承氣湯大黃註曰酒洗洗輕於浸是微升其走下之性以治其中也。至少陽陽明則去正陽而過太陰其分爲下故小承氣湯大黃不用酒製少陽不宜下故去芒硝。又曰少與微瀉之勿令大泄下。此仲景之妙法也。大承氣統治三焦小承氣不犯下焦調胃承氣不犯上焦。

加當歸薑棗煎名當歸承氣湯治裏熱火鬱

或皮膚枯燥或咽燥鼻乾或便溺祕結或瘀血

發狂加當歸入血分以潤燥調營亦與除芒硝

名大黃甘草湯治食已即吐徐忠可曰食已

也明是有物傷胃營氣閉而不納故以大黃通

營分已閉之穀氣而兼以甘草調其胃爾外臺  
用治吐水大黃亦能開脾氣之閉而使散精於  
肺通調水道用大黃二兩半芒硝甘草各二兩  
下輸膀胱也

又名破棺丹治多汗大渴便閉譫語陽結之證

及諸瘡腫熱法董廢翁云按承氣三方俱仲景成

中津液為實熱之邪燔灼枯槁而死皆先賢至  
精至妙之旨也但後世腸胃脆薄者多氣血充  
實者少審之未的或致誤投一下之後變證蜂  
起卒致不救粗工殺人往往因此所以後賢師  
古人之意變古人之法凡審其病係實邪而  
質非強壯脈不牢固者藥用滋陰補水之劑如  
甘露飲四物湯或六味飲貞元飲或左歸飲去  
茯苓加花粉濃煎頻進令胃中津液充足實邪  
自解陰氣外溢則得汗陰血下潤則便通奏效  
雖遲實稱穩當此乃仲景功臣不可不知也又

曰治感證大法。總以始終。照顧胃中津液。爲第一。奧旨。蓋邪之所感。皮毛閉塞。氣不外達。鬱而成熱。熱積皮毛。不解。漸而肌肉熱矣。漸而各經絡無不熱矣。漸而熱氣皆壅塞。陽明府中熱矣。此必然之勢也。又况邇來稟賦漸薄。且喜御酒肉厚味。胃中素有淫熱者多。一旦客熱交併。區區陰津。幾何能當此烈焰燎原乎。凡感證之死。皆由胃汁乾枯故也。是以古人立法。及其邪之在表。血氣未傷之時。當汗之。欲熱從汗解。則清寧安固。而氣血全保。不傷矣。當其邪之在裏。血氣漸虧之際。可徐下之。欲熱隨便通。則焦灼頓除。而氣血可徐俟其來復矣。其有氣血素虧之人。三五日後。不論表證解與未解。裏證急與不急。一見口乾唇焦。舌胎黑燥。全用滋養清涼。虛甚者。并涼藥不用。純陰重劑。加人參升發。運用。但救得胃中津液不竭。其人必不即死。及其津液漸充。汗自能來。宿物自下。至所謂胃中之津液。非他。卽周身氣血所化。乃後天之本也。凡

人平日之強弱及遇外感賊邪之難治易治可治不可治強半憑此粗工不知無論新久虛實但見身熱風藥混表一覺滿悶攻中破氣雜投不効大黃枳朴繼進必求一便以畢其技能豈慮熱得風而益熾陰被劫而速亡何其與先賢之意相反乎

大陷胸湯

仲景

治傷寒下早表邪內陷膈內拒痛

心下因鞭成結胸證或重汗而復下之不大便

五六日舌上燥渴日晡所小有潮熱從心上至

小腹鞭滿而痛不可近者

按之鞭而不痛者為結胸

之太早邪熱乘虛入結於心胸之間故鞭而痛又有鞭痛而無熱證者為寒實結胸白散主之結胸固當下然脈浮大者下之則死以其猶帶表邪下之重虛結而又結故死嘉言曰太陽誤

下之脈。主病皆在陽。在表。即有沉緊。沉滑之藥。皆不得以表陰名之。  
中滿。蓋表邪傳裏。必先胸。以至心腹入胃。是以胸滿多帶。表證宜微汗。脇滿多帶。半表半裏。宜和解。胸中痰實者。宜湧之。如結實燥渴便秘。宜以此湯下之。附白散。巴豆一分。去心皮炒黑。研貝母桔梗各三分。治寒實結胸。巴豆辛熱。以散寒結。貝母苦辛。以散痰熱。結在胸。故以桔梗浮而上之。利膈清表。故病在膈上必吐。病在膈下必利也。

大黃二兩 芒硝升一 甘遂一錢 先煮大黃去渣內

芒硝煮一二沸內甘遂末溫服

表邪入裏結於高位以致三焦俱實手不可近



證爲危急。非常藥所能平。故以甘遂苦寒行水。  
直達爲君。芒硝鹹寒軟堅爲臣。大黃苦寒蕩滌。  
爲使。三藥至峻而有起死之功。

準繩曰邪結胸中處至高之分

宜若可吐然邪氣與胸中陽氣相結不能分解  
壅於心下爲鞭爲痛非虛煩膈實者所可同故  
須攻下也低者舉之高者陷之以平爲期故曰  
陷胸也經又曰太陽病脈浮而動數浮則爲風  
數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜  
汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變  
遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心  
中懊憹陽氣內陷心下因鞭則爲結胸大陷胸  
湯主之朱丹溪曰太陽病在表而攻裏可謂虛  
矣原文曰太陽病脈浮而動數今得誤下動數  
變遲矣又曰胃中空虛又曰短氣躁煩虛之其  
矣錯曰陽氣內陷心下因鞭而可迅攻之乎

陷胸之力。反緩於承氣。一下。再下。寧不畏其虛乎。前文曰。結胸脈浮大者。下之死。又曰。結胸證悉具。煩躁者死。今日脈浮。又曰。煩躁。大陷胸果可用乎。苦胃中空虛。客氣動膈。心中懊懣。當以梔子豉湯吐去胸中之邪。陶節菴曰。結胸乃下早而成。未曾經下者。非結胸也。乃表邪傳至胸中。證雖滿悶。尚爲在表。正屬少陽部分。半表半裏之間。只須小柴胡加枳桔以治。未效。則以小柴胡對小陷胸。一服豁然。若因下早而成者。方用陷胸湯九分。淺溪從緩治之。不宜太峻。上焦乃清。道至高之分。過下則傷元氣也。崔行功曰。傷寒結胸欲絕。心膈高起。手不可近。用大陷胸湯不寒者。此下後虛逆。氣已不理。毒復上攻。當用枳實理中丸。先理其氣。次調諸疾。其效如神。活人云。誤下未成結胸中者。急頻與理中湯。自然解了。蓋理中治中焦故也。胃中雖和。傷寒未退。宜俟日數足。卻以承氣再下之。蓋前來之下未是也。其水結胸者。用小半夏加茯苓湯。小柴

胡去索加牡蠣主之。又有血結胸證。手不可近。漱水不欲嚥。喜忘如狂。大便秘。小便利。宜犀角地黃湯。

小陷胸湯

仲景

治傷寒誤下小結胸正在心下按

之則痛脈浮滑者及痰熱塞胸

此則正在心下

前證痛不可近此則按之則痛結胸脈沉緊或寸浮關沉今脈浮滑知熱未深與此湯以除膈

熱上結

黃連

半夏

升 栝蒌

大者一枚

黃連之苦寒以泄熱栝蒌之寒潤以滌垢半夏之辛溫以散結結胸多由痰熱結聚故用三物

以除痰去熱也

劉心山曰結胸多由痰飲凝結

括婁枳實旋覆之類。皆為痰飲而設也。

大陷胸丸

仲景

治傷寒結胸項強如柔瘕狀

有汗為柔

瘕胸膈實滿故項強而不能俯項屬太陽部位

大黃

八兩

杏仁

去皮尖

葶藶

炒

芒硝

各半升

合研取

如彈丸一枚別搗甘遂末一錢白蜜丸合煮服

大黃之苦寒以泄熱芒硝之鹹寒以軟堅杏仁

之苦甘以降氣葶藶甘遂取其行水而直達白

蜜取其潤滑而甘緩

十棗湯

仲景

治太陽中風下利嘔逆表解者乃可

攻之其人熱熱汗出頭痛心下痞鞭引脇下痛

乾嘔短氣汗出不惡寒表解而裏未和邪熱內

蓄有伏飲者

下利嘔逆裏受邪也汗出不惡寒表已解也頭痛痞鞭引脇下痛乾

嘔短氣邪熱內蓄而有伏飲也此為水氣上逆

嘔逆頭痛與表證頭痛稍別周揚俊曰此證與結胸頗同故湯亦與陷胸相倣

表解後攻與結胸之戒不殊也

芫花

炒

甘遂

大戟

等分

大棗

十枚

先煮棗去滓

內前藥末強人服一錢虛人五分或棗肉為丸

病不除者再服得快下後糜粥自養

芫花大戟之辛苦以逐水飲甘遂苦寒能直達水氣所結之處以攻決爲用三藥過峻故用大棗之甘以緩之益土所以勝水使邪從二便而

出也

十棗湯小青龙湯主水氣乾嘔桂枝湯主太陽汗出乾嘔薑附湯主少陰下利乾嘔

吳茱萸湯主厥陰吐涎沫乾嘔王海藏曰表有水用小青龙裏有水用十棗李時珍曰仲景治傷寒太陽證表未解心下有水氣而咳乾嘔發熱或喘或利小青龙湯主之表已解有時頭痛惡寒心下有水氣乾嘔痛引兩脇或喘或咳十棗湯主之蓋青龙散表邪使水從汗出內經所謂開鬼門也十棗逐裏邪使水從二便出內經所謂潔淨腑去陳莖法也或問十棗湯桂枝去桂加茯苓白朮湯皆屬飲家俱有頭痛項強之證何也張兼善曰太陽陽經多血少氣病人表熱

月一七月  
微渴。恣飲水漿。為水多氣弱。不能施化。本經血氣因而凝滯。致有頭痛項強之患。不須攻表。但宜逐飲。飲盡則自安。杜王曰。裏未和者。蓋痰與燥氣壅於中焦。故頭痛乾嘔。汗出短氣。是痰膈也。非十棗不能除。但此湯不宜輕用。恐損人於倏忽。

除大棗加大黃黑丑輕粉水丸名三花神佑丸

河治壯實人風痰鬱熱支體痲痺走注疼痛溼

熱腫滿氣血壅滯不得宣通及積痰翻胃服二

丸後轉加痛悶此痰涎壅塞頓攻不開再加二

丸快利則止加牽牛大黃大瀉氣血之滯加輕粉無竅不入以去痰積虛人尤不

可輕各五錢加黃檗三兩大黃煨兩粥丸名小

胃丹丹溪治胸膈腸胃熱痰溼痰

赤金豆亦名八仙丹

治諸積不行凡血凝氣滯疼痛

腫脹蟲積結聚癥堅宜此主之此丸去病極速

較之硝黃稜莪之類過傷臟氣者大為勝之

巴霜去皮膜略去油一錢五分生附子切略炒二錢皂角微炒焦二錢

丁香 木香 天竺黃各二錢輕粉一錢硃砂二錢

為末醋浸蒸餅為丸蘿蔔子大硃砂為衣欲

漸去每服五七丸欲驟行者每服一二十丸用

滾水或煎藥或薑醋茶蜜茴香使君子煎湯為



引送下若利多不止可飲冷水一二口卽止蓋  
此藥得熱則行得冷卽止也如治氣滯食滯鼓  
腫先用紅棗煮熟取肉一錢許隨用七八丸甚  
者一二十九丸同棗肉研爛以熱燒酒加白糖少  
許送下如治蟲痛亦用棗肉和服止用清湯送  
下

三物備急丸

千金

治食停腸胃冷熱不調腹脹氣

急痛滿欲死及中惡客忤卒暴諸病

食滯腸胃上焦不行

下腕不通故痛脹欲死內實者法當下之

巴豆霜 大黃 乾薑 等分蜜丸小豆大每服二三丸中惡口噤者折齒灌之崔氏乾薑易桂枝名備急散

大黃苦寒以下熱結巴豆辛熱以下寒結加乾

薑辛散以宣通之

乾薑辛溫開五臟六腑通四肢關節

三藥峻厲

非急莫施故曰備急

太平丸 治胸腹疼痛脹滿及食積氣積氣疝血

疝邪實祕滯等證

此方借些微巴豆以行羣藥之力去滯最妙如欲其峻須

用巴豆二錢

陳皮 厚朴 木香 烏藥 白芥子 草薢

蔻 三稜 蓬蘽 煨 乾薑 牙皂 炒煙斷 澤瀉 各三

錢

已上十一味共為細末另將巴豆用滾湯

泡去皮心并膜稱足一錢用水一碗微火煮半碗將巴豆撈起用乳鉢研極細仍將煎湯攪入研勻然後量藥多少入蒸餅浸爛搗丸前藥如菴荳大每用三分或五分甚者一錢隨證用湯引送下 凡傷食停滯卽以木物湯下 婦人血氣痛或紅花湯下或當歸湯下 氣痛陳皮

湯下 疝氣茴香湯下 寒氣薑湯下 欲瀉

者用熱湯送下一錢未利再服 利多不止用

冷水一二口即止

硃砂丸本治一切積聚痰飲心脇引痛

硃砂 巴豆去油三稜 乾薑 白芷五錢木香

青皮 胡椒二錢乾姜炒大黃一兩檳榔 肉荳

蔻一箇為末醞醋二升煮巴豆五七沸再下三

稜大黃末同煎五七沸入硃砂熬成膏和諸藥

杵丸棗豆大每服五丸薑湯下

此治肉積氣積血積通劑也。硃砂化肉食。

性大

熱能爛五金。本草言其能化人心。爲血故治。膈噎癥瘕肉積有殊功。乾姜散瘀血。

木香青皮行滯氣。三稜破血而行氣。肉蔻煖胃。

而和中。白芷散風而除溼。乾薑胡椒除沉寒。錮。

冷。大黃巴豆能斬關奪門。方內多辛熱有毒之。

品。用之以破冷攻堅。惟大黃苦寒。假之以蕩熱。

去實。蓋積聚既深。攻治不得不峻。用醋者。酸以。

收之也。

玉機微義曰。方中因白芷散水行氣。故更言治痰飲也。潔古曰。壯人無積。虛。

人則有之。皆由脾胃怯弱。氣血兩衰。四時有感。皆能成積。若遠以磨堅破結之藥治之。疾似去。

而人已衰矣。乾茶、硃砂、三稜、大黃、牽牛之類。得藥則暫快。藥過則依然。氣愈消。疾愈大。竟何益哉。故善治者。當先補虛。使氣血旺。積自消。如滿坐皆君子。則小人自無容地也。不問何臟。先調其。中。使。能。飲。食。是。其。本。也。

敦阜丸 治堅頑食積停滯腸胃痛劇不行等證

木香 山查 麥芽 皂角 丁香 烏藥

青皮 陳皮 澤瀉各五錢 巴霜一錢 右共爲末

用生蒜頭一兩研爛加熟水取汁浸蒸餅搗爛丸棗豆大每服二三十丸隨使用湯引送下如未愈徐徐加之

木香檳榔丸

和子

治胸腹積滯痞滿結痛二便不

通或瀉泄下痢裏急後重食瘕實積胸腹痞滿

飲食留滯溼熱鬱積而成二便不通由於熱結裏急後重由於氣滯。按裏急後重有因火熱者火燥物而性急也。有因氣滯者大腸氣壅不得宣通也。有因積滯者腸胃有物結墜也。有氣虛者中氣陷下不能升也。有血虛者津枯腸燥虛坐努責是也。當分證論治。脈洪大而實為裏實宜下若脈浮大慎不可下。

莢蒺醋三稜黃連吳黃黃檗酒炒枳殼陳皮

白青皮醋炒檳榔木香大黃酒浸香附黑

牽牛二兩芒硝水丸量人虛實服一方加當歸

酒洗張子和儒門事親無三稜枳殼只十味絳珠

無三稜陳皮名木香導氣丸

溼熱在三焦氣分木香香附行氣之藥能通三焦解六鬱陳皮理上焦肺氣青皮平下焦肝氣

瀉痢多由肝木剋脾土。

枳殼寬腸而利氣而黑丑檳榔又

下氣之最速者也氣行則無痞滿後重之患矣  
瘧痢由於溼熱鬱積氣血不和黃蘗黃連燥溼  
清熱之藥三稜破血中氣滯莪朮破氣中血滯  
大黃芒硝血分之藥能除血中伏熱通行積滯



竝爲摧堅化痞之峻品。溼熱積滯去，則二便調而三焦通泰矣。蓋宿垢不除，清陽終不得升，故必假此以推蕩之。亦通因通用之意。然非實積不可輕投。滑伯仁曰：陽明燥金也。下焦少金之鬱也。癰閉之用，知母黃芩散相火之熾也。

百順丸 治一切陽邪積滯，凡氣積、血積、蟲積、食

積、傷寒、實熱、祕結等證，但各爲湯引，隨宜送下。

無往不利。

川大黃

錦紋者

牙皂角

炒微黃一兩六錢

爲末湯浸

蒸餅爲丸菉豆大每用五分或一錢或二三錢  
酌宜用引送下或用蜜丸亦可

枳實導滯丸東垣治傷溼熱之物不得施化痞悶

不安腹內硬痛積滯泄瀉

大黃一兩枳實炒黃芩酒炒黃連酒炒神麴五錢白朮土炒

茯苓三錢澤瀉二錢蒸餅爲丸量多寡服

飲食傷滯作痛成積非有以推蕩之則不行積  
滯不盡病終不除故以大黃枳實攻而下之而  
痛瀉反止經所謂通因通用也傷由溼熱黃芩

黃連佐之以清熱茯苓澤瀉佐之以利溼積由  
酒食神麴蒸鬱之物化食解酒因其同類濕而  
消之苓連大黃苦寒太甚恐其傷胃故又以白  
朮之甘溫補土而固中也

倒倉法

丹溪

黃牡牛肉

肥嫩者二三十觔

切碎洗淨用長流水桑

柴火煮糜爛濾去滓取淨汁再入鍋中文武火  
熬至琥珀色則成矣擇一靜室明快不通風者  
令病人先一夜不食坐其中每飲一鍾少時又

飲積數十鍾病在上者必吐病在下者必利病  
在中者吐而且利視所出物可盡病根乃止連  
之。急則逆上而吐多緩則順下吐利後必渴不  
而利多。視病之上下而爲緩急。吐利後必渴不  
得與湯其小便必長取以飲之名輪迴酒非惟  
止渴兼滌餘垢行後倦臥覺饑先與米飲次與  
稀粥三日後方與厚粥軟飯菜羹調養半月一  
月精神煥發沉疴悉痊矣須戒色慾半年一年  
戒牛肉五年 霞天膏卽照前法每肉十二觔  
可熬膏一觔磁罐盛之夏月水浸可留三日寒

天久畱生微用重湯煮入煎劑調服入丸劑每  
三分加麴一分煮糊或同蜜煉

朱丹溪曰牛坤土也黃土之色也以順爲德而  
法健爲功者牡之用也肉胃之藥也液無形之  
物也積聚久則形質成依附腸胃迴薄曲折之  
處以爲巢曰豈銖兩之丸散所能窺其藩牖乎  
肉液充滿流行無處不到如洪水泛漲浮莖陳  
朽皆順流而下不能停畱凡屬滯礙一洗而空  
澤枯潤稿補虛益損寧無精神煥發之樂乎其

方傳於西域異人中年後行一二次亦卻病養

壽之一助也

王綸曰牛肉補中非吐下藥倍補為瀉以瀉為補亦奇方也

蜜煎導法

景仲

治陽明證自汗小便利大便秘者

胃實自汗小便復利此為津液內竭非熱結也若與下藥則液愈耗矣雖大便秘不可攻之宜俟其欲大便然後用此導之法

蜜七合銅器中微火煎頻攪勿令焦候凝如飴

捻作挺子令頭銳大如指長寸許摻皂角末少

許乘熱納穀道中用手抱住大便出時乃去之

加鹽少許亦可

鹹能潤燥軟堅

蜜能潤腸熱能行氣皂能通竅津液內竭槩不可攻須俟其欲便乃導而通之不欲以苦寒傷

胃也

徐忠可曰此為大便秘將行而不能潤利者設也結胸痞滿腸結胃有燥屎皆有見證

今但自作且小便利是津耗熱鬱而乾燥也

豬膽導法

仲景

治證同前

豬膽一枚取汁入醋少許用竹管長三四寸以一半納穀道中將膽汁灌入頃當大便

便秘者屬燥屬熱自汗者為亡津液當小便不利今反利是熱猶未實故不可攻豬膽汁寒勝

熱滑潤燥苦能降醋酸善入故能引入大腸而

通之也

海藏法用蜜煎鹽相合或草烏末相合亦可蓋鹽能軟堅潤燥草烏能化寒消

結可隨證陰陽所宜而用之。準繩曰凡多汗傷津及屢經汗下不解或尺中脈遲弱元氣素虛人便欲下而不潤利者並宜導法但須分津液枯者用蜜導邪熱甚者用膽導溼熱痰飲固結薑汁麻油浸枯薑根導惟下傍流水者導之無益非大承氣峻攻不效以實結在內而不在下也至於陰結便閉者宜於蜜導中加薑汁生附子末或削陳醬薑導之此補長沙之未備也

## 大螺着小腹法

宋季饒醫熊彥誠年五十五歲病前後便溺不通五日腹脹如鼓同輩環視皆不能措力與西



湖沙果僧慧月相善遣信邀至訣別月驚馳而  
往於釣橋逢一異客揖之曰方外高人何子子  
走趨若是月曰一善友久患祕結病危急欲往  
問客曰易事爾待奉施一藥卽脫靴入水探一  
大螺而出曰事濟矣抵家以鹽半匙和殼生搗  
置病者臍下一寸三分用寬帛緊繫之仍辦湯  
器以須其通月未以爲然姑巽謝之至熊家彥  
誠昏不知人妻子聚泣諸醫知無他策慢使試  
之曾未安席而暴下諸醫愧嘆而散月歸

人不見矣。熊後十六年乃終。此因熱祕而便溺不通。大螺性寒而善分清。故濁水之中一着大螺便能澄澈。劑之以鹽取其善潤而已。

罨傷寒結胸法 凡傷寒結胸其有中氣虛弱不

堪攻擊。內消須以此法外罨之。則滯行邪散其

效如神。

葱白頭

兩四

生薑

兩四

生蘿蔔

此味加倍如無以子代之

右三

味共搗一處炒熱。用手巾或白布包作大餅。罨胸前脹痛處。此藥須分二包。冷則輪換。罨之無

不卽時開通汗出而愈但不宜大熱恐炮烙難受也

又法以大蒜頭一二十箇搗爛攤厚紙或薄絹上貼於脹處少頃卽散用治一切腹脹無不神效

### 竹葉薰法

凡大便不通實結在肛門而不得下將烈火煮竹葉一鍋乘滾熱傾淨桶內上撒綠礬末一握上蓋之卽通

又蘿蔔菜薰法

用蘿蔔菜如上法亦妙如無蘿蔔菜卽青菜亦可

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷四下

消導門

附方三十九

枳朮丸

枳朮湯 半夏枳朮丸 木香枳朮丸 橘半枳朮丸 香砂枳朮丸

丸

木香乾薑枳朮丸 木香人參乾薑枳朮丸 平

胃散

除溼湯 加味平胃散 藿香平胃散 人參養

飲和胃飲

保和丸 小保和丸 芍藥枳實丸 痞

氣丸

伏梁丸 肥氣丸 十香丸 枳實消痞丸

廓清飲

健脾丸

益氣健脾丸 養榮健脾丸 舒鬱健脾丸

化痰健脾丸 清火健脾丸 和中解肝煎 排

健脾丸 妙應丸 寬中進食丸 和中解肝煎 排

氣飲 葛花解醒湯 大和中飲 小和中飲

鼈甲飲 小分清飲 方見燥 資生丸 神香散

佐關煎 見祛 寒門 抑扶煎 見祛 寒門

吳氏醫學述第四種

門人周蘭九生庭

武原吳儀洛遵程輯

男

有榆蒼培同較  
有杜雋望

成方切用

消導門

消者散其積也。導者行其氣也。脾虛而為積。或作瀉痢。或成癥痞。以致飲食減少。

五臟無所資稟。氣血日以虛衰。因致危困者多矣。故必消而導之。峻劑已見攻下門。茲集緩攻平治之劑。

枳朮丸

古

消痞除痰健脾進食

白朮

二兩  
土蒸

枳實

一兩  
麩炒

爲末荷葉包陳米飯煨

乾爲丸痞悶加陳皮氣滯加木香傷食加麥芽

神麴

東垣曰白朮甘溫補脾胃之元氣其味苦除胃  
中溼熱利腰臍間血過於枳實尅化之藥一倍  
枳實苦寒泄胃中痞悶化胃中所傷是先補其  
虛而後化其傷則不峻矣荷葉中空色青形仰  
象震在人爲少陽膽胃氣元氣穀氣甲膽上升  
之氣皆生氣也食藥感此氣化胃氣何憂不上



升乎。燒飯與白朮協力。滋養穀氣。補令胃厚。木

致再傷其利廣矣。

王安道曰。勞倦飲食。雖俱為內傷。誠不足矣。飲食傷。又當

於不足之中。分其有餘。夫饑餓不飲食者。胃氣空虛。此為不足而傷也。飲食自倍。腸胃乃傷者。此不足之中。兼有餘而傷也。惟其不足。故補益惟其有餘。故消導。亦有物滯氣傷。宜消補兼行者。亦有物滯氣不傷。但須消導者。亦有不須消導。但須補益者。枳朮丸之類。雖曰消導。固有補益之意焉。若所滯之物。非枳朮丸之力。所能去者。備急丸。煮黃丸。瓜蒂散等。潔古東垣亦未嘗委之而勿用也。景岳曰。枳朮丸。以白朮為君。脾得其燥。所以能健。然佐以枳實。其味苦峻。有推牆倒壁之功。此實寓攻於守之劑。惟脾氣不瀝。而滯勝者。正當用之。若脾氣已虛。非所宜也。今人不察。相傳為補脾之藥。而朝吞暮餌。或以小兒瘦弱。製令常服。則適足以傷其氣。助其瘦爾。

用宜酌也

金匱用枳實七枚白朮二兩作湯名枳朮湯治水飲心下堅大如盤邊如旋盃心下上焦陽分也屬氣分之水加半夏一兩名半夏枳朮丸治脾溼停痰及傷冷食淋者加澤瀉一兩加陳皮半夏名橘半枳朮丸健脾消痞化痰加橘皮一兩名橘皮枳朮丸治飲食不消氣滯痞悶加木香一兩名木香枳朮丸治氣滯痞滿木香平肝行氣使木不尅土再加砂仁名香砂枳朮丸破滯氣消飲食強脾胃再加乾

薑五錢名木香乾薑枳木丸兼治氣寒再加人  
參陳皮名木香人參乾薑枳木丸開胃進食加  
茯苓五錢乾薑七錢名消飲丸治停飲胸滿嘔  
逆加酒炒黃連黃芩大黃炒神麴橘紅各一兩  
名三黃枳木丸治傷肉食溼麪辛熱味厚之物  
填塞悶亂不快加神麴麥芽各一兩名麴蘖枳  
木丸治內傷飲食或泄瀉

平胃散

方局

治脾有停溼痰飲痞膈宿食不消滿

悶嘔瀉

土溼太過木邪乘不勝而侮之脾虛不能健運故有痰食留滯中焦致生痞滿

諸證胃寒則嘔。及山嵐瘴霧不服水土之病亦由

胃虛故易感也

蒼朮

二錢

厚朴

薑製

陳皮

去白

甘草

炙一錢

加薑棗

煎傷食

加神麴

麥芽

或枳實

溼勝

加五苓

痰多

加半夏

脾倦不思食

加參耆

痞悶

加枳殼

木香

大便

秘加大黃

芒硝

小便赤澀

加苓澤

傷寒頭

痛加葱豉

取微汗

蒼朮

辛烈燥溼

而強脾

厚朴

苦溫除溼

而散滿

苦降能瀉實滿

陳皮

辛溫利氣而行痰

甘草

辛溫能散溼滿

陳皮

辛溫利氣

而行痰

甘草

中

辛溫能散溼滿

陳皮

州主藥能補能和為使泄中有補務令溼土底  
於和平也景岳曰平胃者欲平治其不平也此為胃強邪實者設故其性味從辛從燥從苦而能消能散惟有滯有溼有積者宜之今見方家每以此為常服健脾之劑動輒用之而不察其可否其誤甚矣

合二陳加藿香名除溼湯治傷溼腹痛身重足

軟大便溏瀉加藁朮枳殼桔梗名和解散局治

四時傷寒頭痛煩躁自汗咳嗽吐利加藿香半

夏名藿香平胃散又名不換金正氣散局治胃

寒腹痛嘔吐及瘴疫溼瘡再加人參茯苓草菓

生薑烏梅名人參養胃湯治外感風寒內傷生  
冷夾食停痰嵐瘴瘟疫或飲食傷脾發為痰瘧  
老瘧也加麥芽炒麴名加味平胃散治宿食不消  
吞酸噯臭除蒼朮加木香草蔻乾薑茯苓名厚  
朴溫中湯治脾胃虛寒心腹脹滿及秋冬客寒  
犯胃時作疼痛散以辛熱佐以苦甘淡氣溫胃和痛自止矣本方  
一兩加桑白皮一兩名對金飲子治脾胃受溼  
腹脹身重飲食不進肢痠膚腫

和胃飲 治寒溼傷脾霍亂吐瀉及痰飲水氣胃

脘不清嘔惡脹滿等證

陳皮

厚朴

各一錢五分

乾薑

炮二錢

炙甘草

一錢

此即平胃散之變方也凡嘔吐等證多有胃氣虛寒一聞蒼朮之氣亦能動嘔故以乾薑代之凡藿香木香丁香茯苓半夏藕豆砂仁澤瀉之類皆可隨宜增用之若胸腹有滯而兼時氣寒熱加柴胡以清利之

保和丸

治食積飲停腹痛泄瀉痞滿吐酸積滯

惡食食滯下痢

傷於飲食脾不運化滯於腸胃故有泄痢食滯等證傷而未甚

戒方勿用

和胃飲保和丸

五

不欲攻以厲劑。惟以和平之品消而化之。故曰保和。東垣曰。傷飲者。無形之氣也。宜發汗利小便。以導其滯。傷食者。有形之物也。輕則消化。或損其穀。重則方可吐下。脈經云。大腸有宿食。寒慄發熱。有時如瘧。輕則消導。重則下之。

山查

三兩

神麴

炒

茯苓

半夏

一兩

陳皮

萊菔

子

微炒

連翹

錢五

麴和丸

麥芽湯下

或加麥芽

入

藥亦可

山查酸溫收縮之性能消油膩腥羶之食

故收縮食

消陳麴辛溫蒸晉之物能消酒食陳腐之積腹

子辛甘下氣而制麴麥芽鹹溫消穀而軟堅



聖傷食必兼乎溼茯苓補脾而滲溼積久必鬱  
爲熱連翹散結而清熱半夏能潤能燥和胃而  
健脾陳皮能降能升調中而理氣此傷於飲食  
而氣未病者故但當消導也

加白朮白芍去半夏腹子連翹蒸餅糊丸名小  
保和丸助脾進食加白朮二兩名大安丸或加  
人參治飲食不消氣虛邪微加白朮香附黃芩  
黃連厚朴枳實治積聚痞塊合越鞠丸扶脾開  
鬱

芍藥枳實丸

治食積痞滿及小兒腹大脹滿時

常疼痛脾胃不和等證此方較枳朮丸其效更

神

白朮

炒

赤芍藥

酒炒二兩

枳實

炒

陳皮

一兩

荷葉湯

煮黃老米糊為丸桐子大米飲或滾白湯任下

百餘丸

如臍寒加炒黃乾薑一二兩

如脾

胃虛加人參一二兩

痞氣丸

東垣

治脾積在於胃脘大如盤久不愈令

人四肢不收或發黃疸飲食不為肌膚

金匱曰堅而不

移者名積為臌病。推移不定者名聚為臍病。按  
病由陰伏陽蓄氣血不運而成。處心下位中  
史。積寒痞滿。皆土病也。與脹滿有輕重之分。痞  
惟內覺滿悶。脹滿則外有脹急之形也。有中氣  
虛衰不能運化精微而成痞者。有飲食痰積不  
能施化而成痞者。有淫熱太甚上乘心下而成  
痞者。古方用黃連黃芩枳實之苦以泄之。厚朴  
半夏生薑之辛以散之。人參白朮之甘苦溫以  
補之。茯苓澤瀉之淡以滲之。惟宜上下分消其  
氣。果有內實之證。庶可略施疎導。世人苦於痞  
寒。喜用利藥。暫時通快。藥過滋  
甚。皆由不察中氣不運所致爾。

黃連

錢八

厚朴

錢五

吳茱萸

錢三

白朮

土炒

黃芩

錢二

茵陳

酒炒

乾薑

炮

砂仁

錢半

人參

扶苓

澤瀉

錢一

川烏

炮

川椒

分五

桂

巴豆霜

分四

蜜丸

燈草湯下

黃連瀉熱燥溼治痞君藥仲景治痞滿諸厚朴

砂仁行氣而散滿茵陳苓瀉利水以實脾黃芩

清肺而養陰椒萸燥脾而逐冷薑桂川烏補命

火以生脾土而薑桂又能去瘀生新脾無積血

巴豆能消有形滯積為斬關奪門之將藉之以

為先驅加參朮者以補脾元正氣正旺然後可

以祛邪也潔古曰養正積自除

除吳茱白朮扶苓瀉瀉茵陳川椒砂仁如薑瀉

扶神丹參紅豆名伏梁丸治心積起臍上至心

下大如臂令人煩心除吳茱砂仁桂木黃芩澤  
瀉加柴胡莪朮皂角昆布甘草名肥氣丸治肝  
積在左脇下有頭足令人發咳痰瘧不已除吳  
茱白朮砂仁黃芩茵陳澤瀉加紫苑桔梗天冬  
白朮青皮陳皮三稜名息賁丸淡薑湯下治肺  
積在右脇下令人灑淅寒熱喘咳發肺癰秋冬  
黃連減半除吳茱白朮砂仁人參乾薑川椒黃  
芩茵陳加菖蒲丁香附子苦楝延胡獨活全蠍  
名賁豚丸淡鹽湯下治腎積發於小腹上至心

下若豚狀上下無時令人喘咳骨痠及男子七

疝女子瘦聚帶下

此東垣五積方也雖有破滯

助成功經曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

十香丸

治氣滯寒滯諸病

木香

沉香

澤瀉

烏藥

陳皮

丁香

小茴香

香附

酒炒荔枝核

煨焦各等分

皂角

微火燒煙盡滅

半

爲末酒糊丸彈子大者磨化服丸桐子大

者湯引下癰疔之屬溫酒下

枳實消痞丸

東垣

治心下虛痞惡食懶倦右關脈

弦脾虛不運故痞滿惡食脾主四肢虛故懶倦  
右關屬脾脈弦者脾虛而木來侮之也經  
曰太陰所至為積飲痞隔皆陰勝陽也受病之  
臟心與脾也因而鬱塞為痞者火與溼也蓋心  
陽火也主血脾陰土也主溼凡傷其陽則火熒  
鬱而血凝傷其陰則土壅塞而陰聚陰陽之分  
施治之法不可同也

枳實

炒黃連

薑汁炒厚朴

薑炒半夏

炒麥芽

炒人參

白朮

茯苓

甘草

乾薑

錢二

蒸

餅糊丸

枳實苦酸行氣破血黃連苦寒瀉熱開鬱並消

痞之君藥厚朴苦降散溼滿而化食麥芽鹹溫

破結氣而軟堅半夏燥痰溼而和胃乾薑去惡

血而通關

開五臟六腑通四肢關節

皆所以散而瀉之也參

朮苓草甘溫補脾使氣足脾運而痞自化既以

助散瀉之力又以固本使不傷真氣也

玉機微義曰此

半夏瀉心湯加減法也內有枳朮四君平胃等藥利溼消痞補虛之劑也

廓清飲

治三焦壅滯胸膈脹滿氣道不清小水

不利年力未衰通身腫脹或肚腹單脹氣實非

水等證

枳殼

錢二厚朴

一錢半

大腹皮

錢一二

白芥子

七分或二錢



陳皮

二錢

茯苓

連皮用二錢

蘿蔔子

生搗一錢如中不甚脹能食者不用

澤瀉

二錢

水煎食遠服

內熱多火小水熱

數者加梔子木通各一二錢

身黃小水不利

者加茵陳二錢

小腹脹滿大便堅實不通者

加生大黃三五錢

肝滯脇痛者加青皮氣

滯胸腹疼痛者加烏藥香附

食滯者加山查

麥芽

健脾丸

治脾虛氣弱飲食不消

白朮

土

人參

二兩

麥芽

二兩

陳皮

二兩

山查

去核

三 申曲 兩 神麴 糊九米飲下

脾胃者倉廩之官胃虛則不能容受故不嗜食脾虛則不能運化故有積滯所以然者由氣虛也參朮補氣陳皮利氣氣運則脾健而胃強矣山查消肉食麥芽消穀食戊巳不足脾胃為戊土脾為巳土故以二藥助之使化枳實力猛能消積化痞佐以參朮則為功更捷而又不致傷氣也夫脾胃受傷則須補益飲食難化則宜消導合斯二者所以健脾也

去山查麥芽加茯苓炙甘草名益氣健脾丸治  
脾虛食少去山查麥芽陳皮加當歸芍藥芩藟  
麥冬柏子仁名養營健脾丸治脾陰不足飲食  
不爲肌膚血充然去人參枳實麥芽加香附木  
香半夏茯苓神麴黃連當歸芍藥方無荷葉  
燒飯丸名理氣健脾丸治脾胃虛弱久瀉久痢  
去人參山查麥芽加神麴川芎香附麴糊丸名  
舒鬱健脾丸治脾氣鬱滯飲食不消去山查麥  
芽加半夏膽星蛤粉茯苓神麴糊丸名化痰健

脾丸治內傷挾痰去人參山查麥芽加半夏山  
梔黃連水丸名清火健脾丸治脾虛有火去人  
參山查麥芽加木香檳榔厚朴半夏甘草名和  
中健脾丸治胃虛饑不欲食仍用人參名妙應  
丸治胃虛不能食臟腑或結或泄去山查加半  
夏青皮木香砂仁草蔻乾薑炙甘草茯苓豬苓  
澤瀉蒸餅丸名寬中進食丸東垣補脾胃進飲食  
解肝煎 治暴怒傷肝氣逆脹滿陰滯等證如兼  
肝火者宜化肝煎方見瀉火門

陳皮 半夏 厚朴 茯苓一錢五分 蘇葉 芍藥  
錢一砂仁七分 加煨薑三五片 如脇肋脹痛加  
白芥子一錢 胸膈氣滯加枳殼香附藿香之  
屬

排氣飲 治氣逆食滯等證

陳皮 枳殼 藿香一錢五分 香附 澤瀉 烏藥

二錢厚朴一錢 木香七分或一錢 水煎熱服 如食滯

者加山查麥芽各二錢 寒滯者加焦乾薑肉

桂之屬 氣逆之甚者加白芥子沉香青皮檳

月方七月  
柳之屬 嘔而兼痛者加半夏丁香之屬 痛  
在小腹者加小茴香 兼疝者加荔枝核煨熟  
搗碎用二三錢

葛花解醒湯 專治酒積或嘔吐或泄瀉痞塞頭

痛小便不利

酒熱而兼溼熱積於腸胃故見諸證

葛花

豆蔻

砂仁

錢一

木香

分二

青皮

陳皮

人參

白朮

炒

茯苓

分四

神麴

炒

乾薑

豬苓

澤瀉

分三

過飲無度溼熱之毒積於腸胃葛花獨入陽明

令溼熱從肌肉而解。豆蔻砂仁皆辛散解酒故  
以爲君。神麴解酒而化食。木香乾薑調氣而溫  
中。青皮陳皮除痰而疏滯。二苓澤瀉能驅溼熱  
從小便出。乃內外分消之劑。飲多則中氣傷。故  
又加參朮以補其氣也。垣曰。酒大熱有毒。無形  
之物也。傷之只當發汗。次利小便。上下分消其  
溼氣。今人或用酒癥丸。大熱之藥下之。或用大  
黃牽牛下之。是無形元氣受傷。反損有形陰血  
矣。陰血愈虛。陽毒大旺。元氣消亡。而虛損之病成  
矣。葛花解酒而發散。不如枳椇。枳椇一名鷄  
距。一名木蜜。經霜黃赤而味甘。其葉入酒。酒化  
爲水。門外植此木者。屋內釀酒多不佳。

大和中飲 治飲食積滯胃聚等證

陳皮 枳實錢二 厚朴 澤瀉 山查 麥芽錢半

砂仁分五 水煎溫服 脹甚者加白芥子 胃

寒無火或惡心者加炮乾薑一二錢 疼痛者

加木香烏藥香附之類 痰多者加半夏

小和中飲 治胸膈脹悶或婦人胎氣滯滿等證

藷豆炒 山查錢二 陳皮 茯苓 厚朴錢半 甘草分五

加煨薑三五片 嘔者加半夏一二錢 脹

滿而氣不順者加砂仁七八分 火鬱於上者



加炒梔子一二錢 婦人氣逆血滯者加蘇梗

香附之屬 寒滯不行者加乾薑肉桂之屬

髓甲飲

嚴氏

治瘡久不愈腹中結塊名曰瘡母

久瘡

不愈為瘡瘡多成癖於左脇之下名曰瘡母乃肝之積也瘡屬少陽膽經膽與肝相表裏久瘡屬在血分血亦肝所主也當以髓甲為君隨證虛實而施佐使之藥

髓甲

醋炙

白朮

土炒

黃耆

白芍

酒炒

檳榔

草菓

煨

厚朴

陳皮

甘草

等分

薑三片

棗二枚

烏

梅少許煎

久瘡必由脾虛白朮補脾氣黃耆補肺氣使氣

足脾運方能磨積也。川芎補肝而行血中氣滯。  
芍藥助脾而散肝經火邪。二藥竝和厥陰營氣。  
營血調則陰陽和矣。陰陽不和而爭。故發寒發熱。瀝下氣  
而攻積。葶藶煖胃而祛寒。厚朴破血而散滿。陳  
皮理氣而消痰。甘草和中而補土。鼈甲鹹平屬  
陰。色青入肝。專能益陰補虛。清熱散結。故爲痰  
瘧之君藥也。

小分清飲 治小水不利。溼滯脹腫。不能受補等  
證。如兼火者。宜大分清飲。方見燥溼門。

方見卷七下燥溼門

資生丸

健脾開胃消食止瀉調和臟腑滋養營

衛

張三錫曰余初識繆仲醇時見袖中出彈丸

咀嚼問之曰此得之祕傳饑者服之即飽飽者服之即饑因疏其方已於醉飽後頓服二丸徑投枕臥夙興了無停滯始信此方消食之神也

又善治胎前惡阻

白朮

米泔浸用山黃土拌九人參  
蒸九臛去土切片焙乾  
人乳浸飯米

仁神麴

查肉蒸橘紅二兩芡實淨麥芽麴

雲苓

去皮人乳拌懷藥一兩藕豆炒去蓮肉去

一桔梗

飯鍋上蒸臛真藿香洗甘草蜜炙川連薑汁白

豆蔻仁

微炒

澤瀉

二錢五分

末之蜜丸每丸二錢重

每服一丸醉飽後二丸細嚼淡薑湯下

按此方九補九消卽枳朮丸之意而推廣之立方較爲穩妥名曰資生重脾胃也

神香散

治胸膈胃脘逆氣難解疼痛嘔噦脹滿

痰飲隔噎諸藥不效者惟此最妙

丁香

白豆蔻仁

或砂仁亦可

等分爲末清湯調

下七分甚者一錢日數服不拘若寒氣作痛者

薑湯送下